

Le présent outil de suivi est conçu pour vous permettre de noter vos effets secondaires pendant 3 semaines. Il peut être utilisé avec l'outil de suivi Mon ENHERTU pour faciliter les conversations sur le traitement avec les professionnels de la santé (p. ex. oncologue, infirmière, pharmacien).

- ENHERTU (trastuzumab déruxtécán) est utilisé pour traiter les adultes atteints d'un cancer du sein HER2 positif qui s'est propagé à d'autres parties de l'organisme (métastatique) ou qu'on ne peut enlever par chirurgie, et ayant aussi déjà reçu un traitement qui a ciblé le cancer du sein HER2 positif.
- ENHERTU (trastuzumab déruxtécán) est utilisé pour traiter les adultes atteints d'un cancer du sein HER2 positif qui s'est propagé à d'autres parties de l'organisme (métastatique) ou qu'on ne peut enlever par chirurgie, et ayant aussi déjà reçu du trastuzumab emtansine (T-DM1).
- ENHERTU (trastuzumab déruxtécán) est utilisé pour traiter les adultes atteints d'un cancer du sein à faible expression de HER2 qui s'est propagé à d'autres parties de l'organisme (métastatique) ou qu'on ne peut enlever par chirurgie et ayant déjà reçu une chimiothérapie pour une maladie métastatique, ou chez qui la maladie est réapparue pendant une chimiothérapie adjuvante (après la chirurgie) ou dans les 6 mois suivant la fin de ce traitement. Dans le cas d'un cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs (RH+), le patient doit auparavant avoir reçu un traitement hormonal. Un test sera réalisé pour s'assurer qu'ENHERTU est le traitement qui lui convient.

Cette liste d'effets secondaires potentiels n'est pas exhaustive. Veuillez consulter le document «Guide du traitement par ENHERTU» pour obtenir des renseignements sur les effets secondaires graves et les mesures à prendre à leur sujet. Ces effets comprennent notamment des problèmes pulmonaires, cardiaques et immunitaires, des problèmes touchant d'autres organes et des réactions liées à la perfusion.

[illegible]

Exemples		 Toux	 Essoufflement ou respiration sifflante	 Fièvre	 Courbatures et douleurs (p. ex. maux d'estomac ou douleur en urinant)	 Plaies dans la bouche	 Sensation de fatigue	 Frissons ou tremblements	 Étourdissements ou perte de conscience	 Irrégularité des battements cardiaques	 Nausées	Remarques (y compris d'autres effets secondaires potentiels)	
SEMAINE 2	JOUR 8	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup		
	JOUR 9	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup		
	JOUR 10	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	
	JOUR 11	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	
	JOUR 12	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	
	JOUR 13	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	
	JOUR 14	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	
SEMAINE 3	JOUR 15	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup		
	JOUR 16	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	
	JOUR 17	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	
	JOUR 18	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	
	JOUR 19	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	
	JOUR 20	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	
	JOUR 21	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	0Beaucoup	